ICONES SELECTÆ PLANTARUM

Quas in Systemate universali, ex herbariis Parisiensibus, præsertim ex Lessertiano,

descripsit AUG. PYR. DE CANDOLLE.

Ex archetypis speciminibus

a P.J.F. TURPIN delineatæ

et

Editæ a BENJ. DE LESSERT

Academiæ Scientiarum socio honorario &c.

VOL. I.

Exhibens Ranunculaceas, Dilleniaceas, Magnoliaceas, Anonaceas et Menispermeas.

Parisiis.

1820.

LECTORI BENEVOLO.

Descriptiones plantarum ex autopsiâ institutas, et imprimis Iconibus accuratis illustratas, in augendam et dilucidandam Botanicem maximè prodesse nemo sanè inficias ibit. Ex hôc duplici promovendæ amænissimæ scientiæ modo, priorem suscepit celeberr. Candollius, re multæ operæ et diuturni laboris non deterritus. Edito jam primo Systematis naturalis vegetabilium volumine satis superques probatur, quantùm, per secutura præstantissimi operis volumina, et nitoris et augmenti nactura sit Scientia. Et enim antevulgatis longè supereminens habebitur opus, in quo vegetabilia omnia hucùsque in orbe toto detecta, juxtà methodicam Familiarum naturalium seriem digesta, et ideò affinitatum, nec arbitrarii systematis legibus adstricta, per caracteres generum, specierum varietatumque recens elaboratos, descriptiones autopsicas, annotâtiones criticas, synonymiam chronologicam, demùmque curatiorem habitationum designationem, noscere et dignoscere botanicis dabitur.

Nos autem, studio amatæ scientiæ osiosas subsecivi temporis horas permulcere soliti, quantùm licuit, cumulandis servandisque in Musæo nostro rebus botanicis, curam indesinenter impendimus; undè factum est, ut herbaria nostra, sive sumptibus privatis, sive donis, mirum in modum crescerent.

Verùm enim verò, cùm faciliùs ex accuratis Iconibus, quàm ex optimis descriptionibus, novarum caracteres plantarum et peculiaria signa animo menteque complectuntur, ad hanc Botanices partem perficiendam ICONES HASCE SELECTAS, Botanicis oblatas esse voluimus. Non modò novarum specierum habitum, sed et fructificationis partium caracteres delineatos esse utile duximus. Eximius plantarum Iconographus TURPIN, qui peritissimi pictoris solertiam, cum botanici scientiâ conjungit, ad perficiendas nostras ICONES omnem curam operamque contulit, et indè, quantùm possibile fuit, ad artis perfectionem has attulit.

In Systematis vegetabilium ICONIBUS SELECTIS, maxima est habenda fides, nempè è speciminibus architypis semper fuerunt delineata. Quibus enim celeberr. CANDOLLIUS ad descriptiones, his ad pingendas ICONES usi sumus. In Lutetiæ Parisiorum herbariis stirpes illæ novæ et præsertìm in nostro LESSERTIANO MUSÆO, ad botanaphilorum usum servantur.

Itaque si Icones illæ, quæ Systematis vegetabilium Candolliani volumen primum commitari debent, Botanicis placent et utiles gratæque sunt acceptæ, ad augendas scientiæ divitias, in cujus culturâ, rerum publicarum pondere defessi, otia nostra impendimus, in posterùm singula quæque hujusce optimi et omnium maximè necessarii operis volumina, eodem Iconum novarum numero ornatura esse volemus.

INDEX SPECIERUM.

RANUNCULACEÆ.

DILLENIACEÆ.

MAGNOLIACEÆ.

ANONACEÆ.

MENISPERMEÆ.

RANUNCULACEÆ.

CLEMATIS BRASILIANA. Tab. I.

C. Floribus paniculatis dioïcis, foliis trilobis aut ternatim pinnatimve sectis, segmentis petiolulatis ovali-lanceolatis integris aut vix dentatis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 143.

Habitat in Brasiliâ.

Explicatio iconis. — I. Plantæ ramulus naturali magnitudine.

CLEMATIS MAURITIANA. Tab. II.

Clematis mauritiana. Lamk. *Dict.* 2. *p.* 42.

C. pedunculis trifidis, foliis ternatim sectis glabris, segmentis ovatis acuminatis grossè serratis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 152.

Habitat in insulis Mauritii et Madagascar.

Explic. icon. II. — 1. Sepalum naturali magnitudine. — 2. Stamen auctum. — 3. Pistillum id. — 4. Fructuùm capitulus id. — 5. Fructus id. longitudinaliter sectus ita ut seminis tegumentum, endospermium et embryo conspicua sint. — 6. Embryo id.

CLEMATIS LINEARILOBA. Tab. III.

C. pedunculis unifloris, sepalis acutissimis, foliis pinnatim sectis glabris, segmentis integris aut tripartitis, lobis linearibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 155.

Habitat in Carolinâ inferiore.

Explic. icon. III. — 1. Sepali pars aucta.

CLEMATIS DIVERSIFOLIA. Tab. IV.

C. pedunculis unifloris, sepalis acutissimis subpatentibus, foliis glabris, nunc integris, nunc trilobis, nunc trisectis, segmentis lanceolatis acutis, lateralibus sessilibus, medio petiolato. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 155.

Habitat .....; culta in horto Parmensi; floret Septembri.

Explic. icon. IV. — 1. Stamen. — 2. Stylus plumosus.

CLEMATIS GENTIANOÏDES. Tab. V.

C. pedunculis unifloris, floribus erectis dioïcis, foliis ovatis integris dentatisve glabris trinerviis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 159.

HABITAT in *Novæ-Hollandiæ*, insulâ *Mariâ*, et terrâ Van-Diemen.

EXPLIC. ICON. V. — 1. Fructus auctus. — 2. id. longitudinaliter sectus.

THALICTRUM CLAVATUM. Tab. VI.

T. floribus monoïcis, filamentis clavatis, pericarpiis compressis, stylo brevissimo vix rostellatis, foliis glabris exstipellatis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 171.

HABITAT in Americâ boreali.

EXPLIC. ICON. VI. — 1. Flos apertus auctus. — 2. Stamen id. — 3. Fructus cum Staminibus id.

THALICTRUM LONGISTYLUM. Tab. VII.

T. *floribus polygamis, filamentis filiformibus,* antheris longè aristatis, pericarpiis ovali-oblongis stylo longè aristatis, petioli ramis stipellatis, segmentis ad nervos subtus puberulis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 171.

HABITAT in Americâ meridionali.

EXPLIC. ICON. VII. — 1. Flos masculus apertus auctus. — 2. Flos hermaphroditus id. — 3. Stamen id.

THALICTRUM DIOÏCUM. Tab. VIII.

T. DIOÏCUM. L. *Sp.* 768.

T. floribus dioïcis, filamentis filiformibus, foliorum segmentis subrotundis cordatis, obtusè lobatis glabris, pedunculis axillaribus foliis brevioribus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 173.

HABITAT in Canadâ, Pensylvaniâ, Virginiâ, Philadelphiâ.

EXPLIC. ICON. VIII. — A. Specimen masculum. — B. Specimen fœmineum. — 1. Flos masculus. — 2. Flos fœmineus. — 3. Stamen.

THALICTRUM PETALOÏDEUM. Tab. IX.

T. PETALOÏDEUM. L. *Sp.* 770.

T. caule teretri subnudo, floribus corymbosis, staminum filamentis apice dilatatis, foliorum segmentis glabris ovatis obtusis integris trilobisve. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 175.

HABITAT in montosis Dauriæ apud Bouretas, circâ Zmeimogorsk, Zmeiof et in monte Odon-Tchelen ad Sinenses limites : in montibus Altaïcis.

Floret Junio — Julio.

EXPLIC. ICON. IX. — A. Specimen fœmineum. — B. Ramulus speciminis masculi. — 1. Flos masculus. — 2. Stamen. — 3. Sepalum. — 4. Flos fœmineus. — 5. Fructus.

THALICTRUM ACUTILOBUM. Tab. X.

T. caule simplici basi nudo, medio folioso, apice paniculato, foliis pubescenti-viscidulis, segmentorum lobis acutis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 177.

HABITAT in Sibiriâ.

EXPLIC. ICON. X. — 1. Foliolum auctum. — 2. Flos apertus id. — 3. Stamen. id.

THALICTRUM GALIOÏDES. Tab. XI.

T. GALIOÏDES. NESTLER IN PERS. *Syn. Pl.* 2. *p.* 101.

T. caule teretri subsulcato, stricto, radice repente, paniculâ strictâ, floribus nutantibus, foliorum segmentis linearibus angustissimis integerrimis margine revolutis, ultimo subsessili. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 180.

HABITAT in pratis siccis subarenosis nemorosis Alsatiæ circà Argentoratum, Michelfeld; Palatinatûs circà Frankental, in valle Breyninâ Austriæ.

EXPLIC. ICON. XI. — 1. Flos apertus auctus. — 2. Stamen. — 3. Pistilla. — 4. Fructus naturali magnitudine. — 5. id. auctus.

THALICTRUM THUNBERGII. Tab. XII.

T. caule erecto ramoso teretri, paniculâ multiplici erectâ, foliorum segmentis cuneiformibus apice acutè trifidis glaucescentibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 183.

HABITAT in Japoniâ.

EXPLIC. ICON. XII. — 1. Flos apertus auctus. — 2. Pistilla et Stamen id.

ANEMONE PUSILLA. Tab. XIII.

A. foliis ternatim sectis, segmentis multifidis, lobulis linearibus mucronatis, involucralibus sessilibus apice incisis, sepalis 6 oblongis distantibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 197.

HABITAT in insulâ Cypri.

EXPLIC. ICON. XIII. — 1. Stamen auctum. — 2. Pistillum id.

ANEMONE CÆRULEA. Tab. XIV.

A. foliis.......... involucralibus breviter petiolatis trisectis, segmentis inciso-dentatis, sepalis 4-5 ovalibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 203.

Habitat in Sibiriâ circà Zmeof. — Floret primo vere.

Explic. icon. XIV. — 1. Stamen auctum. — 2. Pistillum id.

ANEMONE REFLEXA. Tab. XV.

A. reflexa. Steph. in Willd. *Sp.* 2. *p.* 1282.

A. foliis ternatim sectis, segmentis subtrifidis apice dentatis, involucralibus petiolatis conformibus, sepalis 5-6 linearibus obtusis, reflexis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 207.

Habitat in Sibiriâ.

Explic. icon. XV. — 1. Sepalum auctum. — 2. Stamen id. — 3. Pistillum id.

ANEMONE MULTIFIDA. Var. α. Tab. XVI.

A. multifida. Poir. *Suppl.* 1. *p.* 364.

A. foliis radicalibus ternatim sectis, segmentis multifidis, lobis linearibus, involucri involucellorumque multifidis breviter petiolatis, sepalis 5-10 ellipticis obtusis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 209.

Habitat in Americæ frigidis, ad fretum Magellanicum.

Explic. icon. XVI. — Planta naturali magnitudine.

ANEMONE MULTIFIDA. Tab. XVII.

Var. γ. pedicellis solitariis.

Hæc mera varietas speciem novam et propriam constituere nobis videtur, sub hoc nomine : Anemone Commersoniana, cum hisce caracteribus :

A. villosa, foliis radicalibus ternatim sectis, segmentis multifidis, lobis linearibus acutis; involucralibus, petiolatis similibus; pedunculo solitario 1-floro; flore 8-sepalo; sepalis ovali acutis.

Habitat ad fretum Magellanicum (Commers.)

(V. S. in Musæo Lessertiano.)

Ab Anemone multifidâ differt : caule simplici nec apice ramoso, unifloro; pedunculo solitario; flore lutescente nec albo, majore, 8-sepalo; sepalis ovali-acutis, nec obtusis.

ANEMONE UMBELLATA. Tab. XVIII.

A. umbellata. Willd. *Sp.* 2. *p.* 1284, *non* Lamk.

A. foliis radicalibus 3-5-partitis, laciniis 3-fidis, integerrimis ad margines densè villosis; floribus umbellatis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 213.

HABITAT in Cappadociæ montibus.

EXPLIC. ICON. XVIII. — Planta naturali magnitudine. — 1. Stamen auctum.

KNOWLTONIA GRACILIS. Tab. XIX.

K. foliis biternatim sectis, segmentis ovatis profundè serratis rigidis pilosis, scapis apice ramosis, ramis erectis paucifloris. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 219.

HABITAT ad promontorium Bonæ-Spei.

EXPLIC. ICON. XIX. — 1. Stamen auctum. — 2. Pistillum id.

ADONIS VOLGENSIS. Tab. XX.

A. foliis radicalibus infimisve abortivis ad squamas subvaginantes reductis, mediis et summis sessilibus, carpellis subvelutinis, calyce extus pubescente, petalis 10-12 oblongis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 545.
A. apennina. PALL. *Nov. Act. Petrop. vol.* 10.

HABITAT in Imperio Rutheno, ad flumen Volgam.

EXPLIC. ICON. XX. — 1. Folii segmentum auctum. — 2. Stamen id. — 3. Pistillum.

ADONIS PYRENAÏCA. Tab. XXI.

A. PYRENAÏCA. D. C. *Flor. franç.* ed. 3. suppl. p. 635.

A. foliis radicalibus longè petiolatis, petiolo trifido, segmentis multipartitis summis sessilibus, carpellis glabris petalis, 8-10 oblongo cuneatis integris. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 226.

HABITAT in valle *Eynes* Pyrenæorum orientalium, propè *Ædenburgh* in Hungariâ.

EXPLIC. ICON. XXI. — 1. Ramus fructifer. — 2. Folii segmentum auctum. — 3. Flos apertus subtùs visus. — 4. Stamen auctum. — 5. Fructus id.

HAMADRYAS MAGELLANICA. Tab. XXII.

H. MAGELLANICA. LAMK. *Dict.* 3. p. 67.

H. calyce glabro, foliis supernè glabris tripartitis, lobis inciso-partitis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 226.

HABITAT in nemoribus montosis ad fretum Magellanicum.

EXPLIC. ICON. XXII. — 1. Flos fæmineus. — 2. Sepalum, Petalum et Stamen. — 3. Stamen auctum

CERATOCEPHALUS ORTHOCERAS. Tab. XXIII.

C. pericarpiorum cornubus rectis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 231.

HABITAT frequens in campis incultis Tauriæ, et Sibiriæ australis.

EXPLIC. ICON. XXIII. — 1. Flos apertus auctus. — 2. Petalum. — 3. Pistillum. — 4. Fructuum capitulus. — 5. Fructus auctus immaturus. — 6. Id. longitudinaliter sectus. — 7. Semen.

Synonimis adde :

Ceratocephalus falcatus rossicus. *Fisch! cat. hort. Gor.* 1812. *p.* 48.

Ranunculus testiculatus *M. Bieb. suppl.* 386.

HABITAT ex cl. Fischer à Mari Nigro usque ad flumen Oural et verosimiliter campos Kirghinenses ad Sibiriam Altaïcam.

RANUNCULUS BITERNATUS. Tab. XXIV.

R. BITERNATUS. SMITH IN REES. *Cycl. n.* 48.

R. caule repente, foliis tripartitis, partitionibus trilobis, lobis oblongis acutis, integris subdentatisve, petalis oblongis calyci æqualibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 236.

HABITAT in aquosis ad fretum Magellanicum.

EXPLIC. ICON. XXIV. — 1. Folium auctum. — 2. Flos apertus id. — 3. Stamen id. — 4. Pistillum id.

RANUNCULUS TERNATUS. Tab. XXV.

R. TERNATUS. THUNB. *Jap.* 241.

R. foliis omnibus trisectis, segmentis ovatis trifidis, dentatis, caule pilosiusculo multifloro, calycibus reflexis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 242.

HABITAT in insulâ Nipon Japoniæ. Floret Maio.

EXPLIC. ICON. XXV. — 1. Folium. — 2. Petalum.

RANUNCULUS APIIFOLIUS. Tab. XXVI.

R. APIIFOLIUS PERS. *Syn. Pl.* 2. *p.* 105, *non* DESF.

R. Foliis quinquelobis, lobis sinuato-serratis, supremis sublinearibus, caule glabro multifloro, calycibus patentibus, carpellis muticis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 242.

HABITAT in paludosis et stagnantibus pascuis Bonariæ.

EXPLIC. ICON. XXVI. — 1. Stamen auctum. — 2. Fructus id.

RANUNCULUS ANGUSTIFOLIUS. Tab. XXVII. Fig. A.

R. ANGUSTIFOLIUS. D. C. *Rapp. voy.* 1. p. 78. *Fl. fr.* Suppl. 636.

R. foliis linearibus sublanceolatis glaucescentibus non amplexicaulibus, scapo pedunculisque glabris. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 243.

HABITAT in turfosis montanis Pyrenæorum orientalium circà Mont-Louis.

EXPLIC. ICON. XXVII, *fig.* A. — 1. Petalum. — 2. Fructus.

RANUNCULUS PYRENÆUS. Tab. XXVII. Fig. B.

R. PYRENÆUS. L. *Mant.* 248.

R. foliis linearibus lanceolatisve integerrimis, scapo pedunculisque apice tomentosis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 243.

HABITAT in Alpium, Pyrenæorum pascuis.

EXPLIC. ICON. XXVII, fig. B. — 1. Petalum.

RANUNCULUS AMPLEXICAULIS. Tab. XXVII. Fig. C.

R. AMPLEXICAULIS. L. *Sp.* 774.

R. foliis ovali-lanceolatis acuminatis amplexicaulibus scapo pedunculisque glabris. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 244.

HABITAT in locis excelsis udis scopulosis Alpium Gallo-provinciæ, Apenninorum Pyrenæorum, montium Legionensium, Hiberniæ.

EXPLIC. ICON. XXVII, fig. C. — 1. Petalum.

RANUNCULUS PUSILLUS. Tab. XXVIII.

R. PUSILLUS. POIR. *Dict.* 6. *p.* 99.

R. foliis omnibus longè petiolatis, inferioribus ovatis subdentatis, superioribus lineari-lanceolatis, caulibus plurimis erectis, pedicellis oppositifoliis, petalis calycis longitudine. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 249.

HABITAT ad fontium margines et in locis aquosis depressis Carolinæ.

EXPLIC. ICON. XXVIII. — 1. Petalum. — 2. Stamen auctum. — 3. Fructus id.

RANUNCULUS BONARIENSIS. Tab. XXIX.

R. BONARIENSIS. POIR. *Dict.* 6. *p.* 102.

R. foliis omnibus petiolatis cordato-ovatis, subcrenatis, pediculis oppositi-

foliis, petalis calyce vix longioribus, carpellis lævibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 250.

Habitat in Americæ meridionalis locis udis circà Buenos-Ayres, Santa-Fé.

Explic. icon. XXIX. — 1. Stamen auctum. — 2. Capitulus fructuùm id.

RANUNCULUS LATERIFLORUS. Tab. XXX.

R. foliis radicalibus petiolatis ovali-oblongis, floribus sessilibus oppositifoliis axillaribusve, carpellis granulato-tuberculatis stylo elongato-rostellatis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 251.

Habitat in Oriente.

Explic. icon. XXX. — 1. Capitulus fructuùm auctus. — 2. Fructus id.

RANUNCULUS MYRIOPHYLLUS. Tab. XXXI.

R. foliis decompositis multifidis villoso-canescentibus, laciniis linearibus, caule ramoso adpressè villoso, calyce patente villoso. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 257.

Habitat Aleppo et inter Aleppum et Mossul.

Explic. icon. XXXI. — 1. Folii segmentum auctum. — 2. Petalum id. — 3. Stamen id.

RANUNCULUS ORIENTALIS. Tab. XXXII.

R. orientalis. Lin. *Sp.* 78.

R. foliis decomposito-multifidis pubescentibus, caule ramoso adpressè villoso, calyce reflexo, carpellis longè cornutis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 257.

Habitat in Oriente, in insulâ Lesbo.

Explic. icon. XXXII. — 1. Folii segmentum. — 2. Stamen auctum. — 3. Fructus id.

RANUNCULUS LEPTALEUS. Tab. XXXIII.

R. foliis decomposito-multifidis glabris, caule patulè-piloso, calyce patente, carpellis longè cornutis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 258.

Habitat in insulâ Cypri

Explic. icon. XXXIII. — 1. Petalum. — 2. Stamen auctum. — 3. Fructus id.

RANUNCULUS GUZMANNI. Tab. XXXIV.

R. GUZMANNI. HUMB. *Tab. reg. eq. p.* 69.

R. foliis supernè petiolisque villosis, radicalibus suborbiculatis trifidis, lobis apice grossè dentatis, superioribus trifidis, lobis oblongis integris, caule erecto piloso paucifloro, calyce adpresso villosissimo. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 263.

HABITAT in summis Andium æquatori subjacentium cacuminibus saxosis.

EXPLIC. ICON. XXXIV. — 1. Stamen auctum.

RANUNCULUS KRAPFIA. Tab. XXXV.

R. KRAPFIA. D. C. *in Litter.*

KRAPFIA ranunculina. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 228.

R. foliis petiolisque villosis, radicalibus orbiculatis, apice subtrifidis, basi subcordatis, latè dentatis; caulinis cuneatis trifidis; caule erecto, villoso, unifloro, rarius bifloro; calyce adpresso villoso.

HABITAT in Chili circà Huasa-Huasi.

EXPLIC. ICON. XXXV. — 1. Flos extùs visus. — 2. Petalum à facie externâ. — 3. Id. à facie internâ. — 4. Stamen auctum. — 5. Pistillum id. — 6. Fructus id. — 7. Fructus longitudinaliter sectus.

OBSERVATIO. Hanc Ranunculi speciem, uti novum genus sub nomine *Krapfiæ ranunculinæ*, in Systemate Vegetabilium celeberrimus Candollius descripsit. Hoc novum genus institutum fuerat, ob corollæ defectum in speciminibus à celeb. Candollio inspectis. Sed cùm hoc signum in multis etiam Ranunculi speciebus accidit, scilicet in Ran. Auricomo, in R. Parnassiæfolio, varietatem tantùm constituit. Et enim in Musæi Parisini herbariis hujus speciei specimina, cum petalis obcordatis integris, basi foveolatis calyce adpresso villoso circumdatis, reperta fuerunt. Indò Candollius in litteris genus Krapfiam reformavit, et huic plantæ Ranunculi Krapfiæ nomen imposuit.

R. Krapfia accedit ad R. Guzmanni et ad aliam speciem novam ex eâdem regione ortam, quam Candollius vidit in herb. Lambertiano; hæ 3 species Chilenses aut Peruvianæ parvulam in Ranunculorum vastissimo genere sectionem constituunt.

Tertia species sic definiatur :

R. Cochleariifolius. R. foliorum radicalium petiolis basi membranâ auctis, limbis orbiculatis crenatis glabris pilosisve, foliis caulinis ovato-lanceolatis sessilibus, caule glabro paucifloro, calyce ad presso.

R. Cochlearifolius. Ruiz et Pavon. *Fl. Per. ined. non* Horn. *D. C. in Litt.*

Habitat in Peruviæ montibus *R. et P.* ♃ (v. s. sp. in h. Lamb.)

Affinis hinc R. Thoræ, illinc R. Guzmanni.

RANUNCULUS CORTUSÆFOLIUS. Tab. XXXVI.

R. cortusæfolius. Willd. *Enum.* 588.

R. foliis cauleque subpilosis, radicalibus subcordato reniformibus sublobatis, latè crenatis, caulinis subsessilibus, 3-5-partitis, floralibus lanceolatis, caule ramoso corymboso, calyce patentissimo. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 264.

Habitat in Canariis, in rupibus regionis sylvaticæ insulæ Teneriffæ. ♃.

Explic. icon. XXXVI. — 1. Sepalum. — 2. Petalum. — 3, 4. Fructus.

RANUNCULUS PERUVIANUS. Tab. XXXVII.

R. peruvianus. Pers. *Ench.* 2. *p.* 103.

R. foliis subpilosis, radicalibus longè petiolatis semiorbiculatis crenatis, caulinis sessilibus in lobos lineares integros multipartitis, calyce villosissimo. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 274.

Habitat in Peruviâ, in humidis Antisanæ ♃.

Explic. icon. XXXVII. — 1. Stamen auctum.

RANUNCULUS POLYRHIZOS. Tab. XXXVIII.

R. polyrhizos. Steph. *in* Willd. *Sp.* 2. *p.* 1324.

R. foliis glabris radicalibus petiolatis 3-5-fidis, lobis ovatis integris, caulinis sessilibus in lobos lineares multipartitis, caule subprostrato 1-3-floro, calyce patente glabro. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 274.

Habitat in regione Caucasicâ, frequens circà coloniam Sareptanum et ad fluvios Terek et Wolgam, in desertis Caspicis et in collibus Altaïci jugi. ♃.

Floret primo vere.

Explic. icon. XXXVIII. — 1. Petalum. — 2. Stamen auctum. — 3. Fructus id.

RANUNCULUS SERICEUS. Tab. XXXIX.

R. sericeus. Poir. *Dict.* 6. *p.* 109, *non* Willd.

R. foliis villoso-sericeis, radicalibus petiolatis 3-5-partitis, caulinis 3-sectis, segmentis longè petiolatis 3-partitis, omnium lobis inciso-serratis, caule erecto villoso multifloro, calyce patente. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 284.

Habitat in insulis Mauritianis.

Explic. icon. XXXIX. — 1. Petalum. — 2. Stamen auctum. — 3. Fructus.

RANUNCULUS RHÆADIFOLIUS. Tab. XL.

R. foliis subglabris pinnatim trisectis, inferiorum petiolis longis, segmentis ovalibus trilobis grossè dentatis, superiorum lobulis linearibus, caule erecto sub ramoso sub glabro, calyce reflexo. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 284.

Habitat in agro Magadoriensi aut forsan in Canariis. ♃.

Explic. icon. XL. — 1. Stamen auctum.

RANUNCULUS RECURVATUS. Tab. XLI.

R. recurvatus. Poir. *Dict.* 6. *p.* 123.

R. caule erecto petiolisque patentim pilosissimis, foliis tripartitis adpressè villosis, partitionibus ovalibus subincisis dentatis, calyce reflexo, carpellis stylo uncinato. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 290.

Habitat in Sylvis Americæ septentrionalis, in Carolinâ, circà New-Yorck, à Noveboraco ad Carolinam, in Labrador, in insulâ Unalaschkâ una ex Aleutienis. ♃.

Explic. icon. XLI. — 1. Flos apertus auctus. — 2. Petalum. — 3. Pistillum id. — 4. Fructus id.

RANUNCULUS PEDUNCULARIS. Tab. XLII.

R. peduncularis. Smith. *in* Rees. *cycl. n.* 49.

R. foliis subglabris radicalibus petiolatis trisectis, segmentis trilobatis apice acutè incisis, caulinis 1-2 linearibus trifidisve, caule erecto 1-folio, 1-2-floro, calyce demùm reflexo, petalis 8-10 oblongis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 294.

HABITAT ad sylvarum margines freti Magellanici loco dicto *Freshwater-bay*, seu *Baye Duclos*. ♃.

Floret Decemb.

EXPLIC. ICON. XLII. — 1. Stamen auctum. — 2. Pistillum.

CALTHA APPENDICULATA. Tab. XLIII.

C. APPENDICULATA. PERS. *Syn. pl.* 2. *p.* 107.

C. scapo 1-floro brevissimo, foliis trifidis cuneiformibus, sepalis 5, pistillis 8. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 307.

HABITAT in montosis humentibus freti Magellanici propè portum Golani, in collibus subalpinis Terræ del Fuego.

EXPLIC. ICON. XLIII. — 1, 2, 3. Variæ foliorum figuræ. — 4. Flos apertus. — 5. Stamen auctum.

TROLLIUS PATULUS. Tab. XLIV.

T. PATULUS. SALISB. *Tr. Lin. Soc.* 8. *p.* 303.

T. sepalis 5 patentibus, petalis 1-5 stamina æquantibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 313.

HABITAT in Sibiriâ, Cappadociæ montibus altissimis; Iberiæ montibus.

EXPLIC. ICON. XLIV. — 1. Petalum. — 2. Stamen.

NIGELLA CILIARIS. Tab. XLV.

N. capsulis 8-10 hispidulis imâ basi connexis, stellatim patentibus, stylis rectis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 327.

HABITAT in Oriente propè Barut.

EXPLIC. ICON. XLV. — 1, 2. Semina aucta.

NIGELLA DIVARICATA. Tab. XLVI.

N. DIVARICATA. BEAUPRÉ. *Ined.*

N. antheris apiculatis, stylis 5 erectiusculis, capsulis lævibus in fructum obconicum ultrà medium connexis, caule glabro, ramis divaricatissimis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 329.

HABITAT in Tauriâ, in Ægypto.

EXPLIC. ICON. XLVI. — 1. Petalum auctum. — 2. Stamen id.

AQUILEGIA SIBIRICA. Tab. XLVII.

A. SIBIRICA. LAM. *Dict.* 1. *p.* 150.

A. calcaribus incurvis, capsulis glaberrimis, caule 1-2 floro subnudo glabro, sepalis obtusissimis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 336.

HABITAT in sylvis Daouriæ.

EXPLIC. ICON. XLVII. — 1. Stamen.

AQUILEGIA ALPINA. Tab. XLVIII.

A. ALPINA. L. *Sp.* 752.

A. calcaribus rectis apice subincurvis limbo petalorum dimidio brevioribus, caule 2-3 floro, folioso, foliorum segmentis in lobos lineares multifidis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 336.

HABITAT in locis umbrosis Alpium Pedemontii; Sabaudiæ, Helvetiæ, Sibiriæ.

EXPLIC. ICON. XLVIII. — 1. Stamen auctum.

N. B. Aquilegia pyrenaica diu cum hâc Aq. alpinâ confusa est ex cl. Bertolonio (Amœn. ital. p. 374,) et Candollio (in Litt.), Aquilegia viscosa. *Trevir. delph. p.* 23, *t.* 2, *non Gou.*

AQUILEGIA DAOURICA. Tab. XLIX.

A. DAOURICA. PATRIN. *Herb.*

A. calcaribus rectis limbo brevioribus, staminibus vix subexsertis, stylis longè exsertis, sepalis acutis petalis brevioribus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 338.

HABITAT in *Daouriæ* collibus montanisque circà *Nerlschenses officinas.* ♃.

EXPLIC. ICON. XLIX. — 1. Stamen auctum.

Candollius habuit vivam *in horto Genevensi stirpem* omnino mediam inter Aquilegiam Daouricam et atropurpuream, unde nunc autumat has stirpers in unicam colligendas esse, sequenti modo:

AQUILEGIA ATROPURPUREA.

α. Stylis stamina non superantibus.

A. atropurpurea. *Willd. Enum.* 577.

β. Stylis longè exsertis, foliis glabris.

A. Daouria. Patr! *D. C. Syst.* 1. *p.* 338.

γ. Stylis longò exsertis, foliis subtus villosis.

A. atropurpurea. *Fisch!* *in Litt.*

DELPHINIUM AXILLIFLORUM. Tab. L.

D. caule subsimplici, subglabro, floribus axillaribus subsessilibus, bracteatis sub flore sitis multifidis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 341.

Habitat in Oriente.

Explic. icon. L. — 1. Flos cum petalo superiore. — 2. Stamen. — 3. Pistillum.

DELPHINIUM OLIVERIANUM. Tab. LI.

D. caule glabro subramoso, ramis vix divergentibus paucis laxè racemosis, pedicellis bracteæ longitudine, capsulis glabris. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 341.

Habitat in agris cultis inter *Bagdad* et *Vermancha*. ⊙.

Explic. icon. LI. — 1. Flos cum petali calcarato. — 2. Stamen. — 3. Pistillum.

DELPHINIUM RIGIDUM. Tab. LII.

D. caule erecto ramosissimo rigido, foliis capsulisque velutino-canescentibus, pedicellis bracteâ triplò longioribus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 344.

Habitat in Oriente.

Explic. icon. LII. — 1. Flos cum petalo superiore.

DELPHINIUM EXSERTUM. Tab. LIII.

D. caule erecto ramoso glabro, foliis trisectis, segmentis petiolulatis palmato-multifidis, pedicellis bracteis vix longioribus, calcare recto, staminibus exsertis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 345.

Habitat in Oriente. ⊙.

Explic. icon. LIII. — 1. Petalum superius. — 2. Corolla anticè visa. — 3. Stamen. — 4. Pistillum.

DELPHINIUM FLAVUM. Tab. LIV.

D. caule erecto, ramoso supernè pubescente, foliis palmato-multipartitis, pedicellis distantibus floris longitudine, calcare recto patente, staminibus subexsertis, capsulâ cylindraceâ pubescente. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 346.

Habitat in Oriente, verosimiliter in Archipelago. ⊙.

Explic. icon. LIV. — 1. Genitalia cum petalo superiore. — 2. Petalum superius. — 3. Stamen. — 4. Pistillum.

DELPHINIUM VIRGATUM. Tab. LV.

D. virgatum. Poir. *Suppl.* 2. *p.* 458.

D. caule erecto à basi ramoso, foliis glabris, inferioribus trifidis, lobis tridentatis, rameis floralibusque integris acutis, racemis laxis, petalis inferioribus stipitatis limbo ovato. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 349.

Habitat in Syriâ. ⊙.

Explic. icon. LV. — 1. Radix. — 2. Flos integer. — 3. Petala lateralia.

DELPHINIUM MACROPETALUM. Tab. LVI.

D. caule erecto ramosissimo, foliis glabris membranaceis inferioribus palmato-multifidis, summis linearibus acutissimis, racemis laxis, petalis inferioribus stipitatis limbo ovato. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 350.

Habitat in Africâ boreali circà Mogador. ⊙.

Explic. icon. LVI. — 1. Sepala. — 2. Petala. — 3. Stamina. — 4. Pistilla.

DELPHINIUM OBCORDATUM. Tab. LVII.

D. caule erecto ramoso, foliis glabris, caulinis trilobatis, lobis subbifidis, rameis floralibusque integris acutis, racemis laxis, petalis inferioribus stipitatis limbo obcordato. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 350.

Habitat in Barbariâ. ⊙.

Explic. icon. LVII. — 1. Sepala. — 2. Petala. — 3. Stamina. — 4. Pistilla.

DELPHINIUM ALBIFLORUM. Tab. LVIII.

D. petiolis basi dilatato-vaginantibus, foliis multipartitis, lobis linearibus, racemo elongato conferto, bracteis membranaceis lato-lanceolatis, calcare recto obtuso pedicello sublongiore. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 353.

Habitat in Armeniâ. ♃.

Explic. icon. LVIII. — 1. Genitalia cum petalis. — 2. Stamen. — 3. Pistilla.

DELPHINIUM TRICORNE. Tab. LIX.

D. TRICORNE. MICHX. *Fl. bor. am.* 1. *p.* 314.

D. petiolis basi vix dilatatis basi glabris, foliis quinquepartitis, lobis 3-5-fidis, lobulis linearibus, petalis calyce brevioribus, capsulis à basi patulo-reflexis arcuatis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 356.

HABITAT in altissimis montibus à Carolinâ ad Virginiam; in Louisianâ superiore. ♃.

EXPLIC. ICON. LIX. — 1. Genitalia cum petalis. — 2. Stamen. — 3. Pistilla.

DELPHINIUM AZUREUM. Tab. LX.

D. AZUREUM. MICHX. *Fl. bor. am.* 1. *p.* 314.

D. petiolis basi vix dilatatis, foliis 3-5 partitis multifidis, lobis linearibus, racemo stricto, petalis omnibus apice barbatis, inferioribus villosissimis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 356.

HABITAT ad sylvarum margines, locis arenosis in Carolinâ et Georgiâ, ad Missouri et Mississipi ripas. ♃.

EXPLIC. ICON. LX. — 1. Genitalia cum petalis. — 2. Stamen. — 3. Pistilla.

DELPHINIUM CUNEATUM. Tab. LXI.

D. CUNEATUM. STEV. *Diss. ined.*

D. petiolis basi non dilatatis, foliis basi cuneatis 5-7 lobatis, lobis incisis, acutis, racemo laxo ramoso, bracteolis calycibusque glabris, capsulis subpubescentibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 359.

HABITAT circà *Saratof* et ad Volgam inferiorem. ♃.

EXPLIC. ICON. LXI. — 1. Sepala. — 2. Petala. — 3. Stamina. — 4. Stamen. — 5. Pistilla.

DELPHINIUM SPECIOSUM. Tab. LXII.

D. SPECIOSUM. MARSH. BIB. *Fl. Cauc.* 2. *p.* 12.

D. petiolis basi non dilatatis, foliis pubescentibus 5-lobatis, lobis inciso-serratis, bracteis lanceolatis villoso-viscosis, calcare curvulo, capsulis glabris. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 361.

HABITAT in regione Caucasicâ ad Alpem *Kraischaur.*

EXPLIC. ICON. LXII. — 1. Genitalia cum petalis. — 2. Stamen. — 3. Pistilla.

DELPHINIUM REQUIENII. Tab. LXIII.

D. REQUIENII. *D. C. Fl. fr. ed.* 3. *v.* 5. *p.* 642.

D. calcare calycis ferè longitudine, bracteolis medio pedicelli insertis, petiolis pilosis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 362.

HABITAT in insulis *Stœchadum*. ⊙.

EXPLIC. ICON. LXIII. — 1. Flos integer. — 2. Sepala. — 3. Petala. — 4. Genitalia. — 5. Stamen. — 6. Pistilla.

ACONITUM BARBATUM. Tab. LXIV.

A. BARBATUM. PATR. *Ined.* PERS. *Syn. pl.* 2. *p.* 83.

A. galeâ conicâ obtusâ, calcare recto, labio obovato, alis barbato-ciliatis, bracteis minimis, caule pubescente, foliis quinquepartitis, lobis linearibus acuminatis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 367.

HABITAT in Sibiriâ orientali circâ *Irkoulsk*. ♃.

EXPLIC. ICON. LXIV. — 1. Flos integer. — 2. Petalum laterale. — 3. Genitalia cum petalis superioribus.

ACONITUM CILIARE. Tab. LXV.

A. caule volubili patentim piloso, petiolis ciliatis, foliis 3-5-partitis, partitionibus pinnatifidis, lobulis lineari-lanceolatis, racemo laxo, ovariis 5-7. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 378.

HABITAT in Sibiriâ.

EXPLIC. ICON. LXV. — 1. Ramus florifer, naturali magnitudine.

ACTÆA PODOCARPA. Tab. LXVI.

A. ovariis 4-5 glabris stipitatis, racemis paniculatis, foliis decompositis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 382.

HABITAT in opacis sylvaticis montium Carolinæ. ♃.

EXPLIC. ICON. LXVI. — 1. Flos nundùm apertus. — 2. Flos cum pistillis et stamine. — 3. Stamen anticè visum. — 4. Id. posticè. — 5. Capsula aperta. — 6. Semen.

DILLENIACEÆ.

TETRACERA OBLONGATA. Tab. LXVII.

T. Foliis oblongis obtusis utrinque scabris sinuato-dentatis, floribus in racemum simplicem densum congestis, pediculis glabris. *D. C. Syst nat. veg.* 1. *p.* 399.

Habitat in Brasiliâ circâ Sebastianopolim.

Explic. icon. LXVII. — 1. Capsulæ stellatim dispositæ. — 2. Capsula longitudinaliter secta.

TETRACERA OVALIFOLIA. Tab. LXVIII.

T. foliis ovalibus obtusis integerrimis, utrinque scabriusculis, pedunculis racemosis subvelutinis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 400.

Habitat in Cayennâ.

Explic. icon. LXVIII. — 1. Flos apertus. — 2. Stamen. — 3. Pistilla. — 4. Capsulæ. — 5. Capsula dehiscens. — 6. Semen longitudinaliter sectum. — 7. Semen posticè visum.

TETRACERA MULTIFLORA. Tab. LXIX.

T. foliis ovalibus subobtusis apice sinuato-dentatis, secùs petiolum subproductis lævibus, paniculâ multiflorâ, pedicellis glabris. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 400.

Habitat in Parâ.

Explic. icon. LXIX. — 1. Flos apertus. — 2. Id. subtùs visus. — 3. Petalum. — 4. Stamen. — 5. Pistillum.

TETRACERA EURYANDRA. Tab. LXX.

T. euryandra. Valh. *Symb.* 3. *p.* 71.

T. foliis ovalibus obtusis integerrimis lævibus, pedunculis paniculato-racemosis pubescentibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 402.

Habitat in novâ Caledoniâ.

Explic. icon. LXX. — 1. Flos apertus. — 2. Stamen: — 3. Capsulæ.

DAVILLA BRASILIANA. Tab. LXXI.

D. foliis oblongis, obtusis, basi attenuatis sinuosis; floribus subpaniculatis.

Habitat in Brasiliâ.

Explic. icon. LXXI. — 1. Flos nondùm apertus. — 2. Flos apertus cum sepalis duobus interioribus majoribus concavis. — 3. Stamen. — 4. Fructus immaturus cum sepalis interioribus. — 5. Semen arillo cinctum. — 6. Id. arillo avulso. — 7. Id. longitudinaliter sectum.

DELIMA HEBECARPA. Tab. LXXII.

D. foliis obovatis subcrenulatis scabris, floribus hermaphroditis paniculatis, ovariis capsulisque pubescentibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 407.

Habitat in Javâ, insulis Philippinis et insulâ Principis.

Explic. icon. LXXII. — 1. Flos apertus. — 2. Petalum. — 3. Stamen. — 4. Capsula. — 5. Eâdem transversim secta. — 6. Semen cum arillo, magnitudine naturali. — 7. Id. auctum.

PACHYNEMA.

Ex observationibus amicissimi Turpin, in hôc genere petala quinque suborbiculata sepalis paulisper breviora, nundùm observata, adsunt : Stamina 9, quorum 7 fertilia, 2 sterilia nec antherifera. Ovarium 1-loculare, 1-ovulatum, indè Fructus capsularis monospermus ; semen arillo obliquo truncato fimbriato cinctum.

Caracter reformatus.

PACHYNEMA.

Pachynema. R. Brown. *Ined.*

Fruct. Sepala 5 subrotunda concava persistentia : Petala quinque calyce paulisper breviora suborbiculata, obtusa : Stamina 9, quorum 7 fertilia, filamentis basi crassissimis erectis apice antheriferis ; antheris ovatis terminalibus ; 2 sterilia, nec antherifera ; filamentis sub fusiformibus elongatis : Ovaria 2-3 ovata in stylos subulatos desinentia, 1-locularia, 1-ovulata : ovulo erecto : Fructus capsularis, 1-locularis, monospermus : Semen basi arillo obliquo truncato fimbriato cinctum.

PACHYNEMA COMPLANATUM. Tab. LXXIII.

P. complanatum. R. Brown. *Ined.*

P. caule complanato subtrigono, aphyllo denticulato (denticulis foliorum vestigiis) ; flores supra-axillares pedunculati solitarii.

Habitat ad Carpentariam.

Explic. icon. LXXIII. — 1. Folium squamuliforme. — 2. Flos supra-axillaris. — 3. Flos nundùm apertus. — 4. Flos apertus integer. — 5. Id. subtùs visus. — 6. Stamen fertile. —

7. Id. abortivum. — 8. Pistilla. — 9. Capsulæ. — 10. Capsula longitudinaliter secta. — 11. Eadem transversim.

HEMISTEMMA COMMERSONII. Tab. LXXIV.

H. foliis oppositis ovali-oblongis mucronatis, pedunculis tomentosis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 413.

HABITAT in Madagascar.

EXPLIC. ICON. LXXIV. — 1. Flos apertus, corollâ avulsâ. — 2. Stamina. — 3. Stamen fertile. — 4. Id. abortivum. — 5. Petalum.

HEMISTEMMA AUBERTII. Tab. LXXV.

H. foliis oppositis oblongis lanceolatis basi attenuatis apice acutis, pedunculis glabriusculis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 313.

HABITAT in Madagascar.

EXPLIC. ICON. LXXV. — 1. Calyx. — 2. Genitalia. — 3. Stamina. — 4. Stamen fertile. — 5. Id. abortivum. — 6. Petalum.

HEMISTEMMA DEALBATUM. Tab. LXXVI.

H. DEALBATUM. R. BROWN. *Ined.*

H. foliis alternis obovato-oblongis basi attenuatis apice obtusis mucronatis, subtùs pube adpressissimâ candicantibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 413.

HABITAT in Novæ-Hollandiæ terrâ *Arnheimicâ.*

EXPLIC. ICON. LXXVI. — 1. Flos apertus. — 2. Calyx. — 3. Genitalia cum calyce. — 4. Stamina. — 5. Stamen fertile. — 6. Id. abortivum.

HEMISTEMMA ANGUSTIFOLIUM. Tab. LXXVII.

H. ANGUSTIFOLIUM. R. BROWN. *Ined.*

H. foliis alternis longis linearibus acutis subtùs candicantibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 414.

HABITAT in Novæ-Hollandiæ terrâ *Arnheimicâ.*

EXPLIC. ICON. LXXVII. — 1. Folium. — 2. Flos apertus. — 3. Stamen abortivum. — 4. Stamen fertile.

PLEURANDRA BRACTEATA. Tab. LXXVIII.

P. BRACTEATA. R. BROWN. *Ined.*

P. foliis oblongis subglabris mucronulatis, bracteis circà flores sessilibus con-

fertis extùs sericeo-villosis, ovariis hirsutissimis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 415.

HABITAT in Novâ-Hollandiâ circà *port Jakson.*

EXPLIC. ICON. LXXVIII. — 1. Flos apertus — 2. Petalum. — 3. Stamen. — 4. Genitalia.

PLEURANDRA SERICEA. Tab. LXXIX.

P. SERICEA. R. BROWN. *Ined.*

P. foliis oblongis margine revolutis, supernè subpilosis subtùs velutinis, ramis hirsutis, floribus sessilibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 416.

HABITAT in Novæ-Hollandiæ littore orientali et ad fretum *Bassii.*

EXPLIC. ICON. LXXIX. — 1. Folium. — 2. Flos apertus. — 3. Calyx cum genitalibus.

PLEURANDRA FURFURACEA. Tab. LXXX.

P. FURFURACEA. R. BROWN. *Ined.*

P. foliis oblongis planis obtusis supernè subscabris subtùs tomentoso-velutinis, floribus pedicellatis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 417.

HABITAT in Novâ-Hollandiâ loco *King's Georges Sound* anglicè dicto.

EXPLIC. ICON. LXXX. — 1. Folium subtus visum. — 2. Flos apertus. — 3. Capsulæ transversim sectæ. — 4. Capsulæ apertæ. — 5. Semina. — 6. Semen longitudinaliter sectum. — 7. Pilus ramorum stellatus.

PLEURANDRA HYPERICOÏDES. Tab. LXXXI.

P. foliis linearibus obtusis margine revolutis supernè scabris subtùs incanis, floribus pedicellatis, calycibus subpubentibus, ovariis velutinis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 421.

HABITAT in Novæ-Hollandiæ orâ orientali, ad rivum Cygnorum.

EXPLIC. ICON. LXXXI. — 1. Folium facie superiore visum. — 2. Id. subtùs. — 3. Flos apertus. — 4. Stamen cum filamentis externis basi connatis.

WORMIA MADAGASCARIENSIS. Tab. LXXXII.

LENIDIA MADAGASCARIENSIS. POIR. *Supl.* 3. *p.* 330.

W. foliis ovalibus obtusè sinuatis, pedunculis paniculato-racemosis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 433.

HABITAT in Madagascar.

EXPLIC. ICON. LXXXII. — 1. Stamen.

MAGNOLIACEÆ.

DRYMIS CHILENSIS. Tab. LXXXIII.

D. foliis oblongo-obovatis subtùs glaucis, pedicellis confertis 1-floris aut è pedunculo communi ortis, petalis 6-9-oblongis subobtusis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 444.

Habitat in Regni Chilensis paludosis.

Explic. icon. LXXXIII. — 1. Flos absquè Corollâ. — 2. Stamen. — 3. Pistillum. — 4. Capsulæ.

TASMANNIA AROMATICA. Tab. LXXXIV.

T. aromatica. R. Brown. *Prodr. N.-Holl.* 2. *Ined.*

T. foliis oblongis basi in petiolum sensim attenuatis, fructibus globosis subdidymis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 445 *et* 447.

Habitat in Novæ-Hollandiæ frigidioribus nempè in montibus insulæ *Van-Diemen*, in insulâ *King* et ad fretum *d'Entrecasteaux*.

Explic. icon. LXXXIV. — 1. Capsula. — 2. Eadem transversim secta. — 3. Semen à latere visum. — 4. Id. à dorso. — 5. Id. longitudinaliter sectum.

MICHELIA PARVIFLORA. Tab. LXXXV.

M. parviflora. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 449.

M. foliis ellipticis subacuminatis, glabris; floribus minoribus.

Rami teretes tomentosi fusci; Foliis alternis approximatis brevissimè petiolatis ellipticis subacuminatis, integris, coriaceis, supra lœvibus, subtùs venosis, longitudine bi aut triuncialibus, latitudine uni-biuncialibus.

Flores crocei axillares, solitarii, sæpius bini, breviter pedunculati, pedunculo crasso, erecto, tomentoso, fusco; bractæa spathæformis univalvis, extus tomentosa florem antè anthesin omnino obtegens et involvens, lateraliter quasi dehiscens et caduca.

Calyx trisepalus, corollâ pauló brevior; sepalis erectis, suborbiculatis, concavis, obtusis, tomentosis, persistentibus.

Corolla hexapetala subcampanulæformis crocea, petala ovali-suborbiculata, concava, crassa, apice subinvoluta, obtusiuscula.

Stamina numerosa in globum conferta, petalis dimidiò breviora : filamentis brevissimis crassis; antheris linearibus acutis, bilocularibus, sulco longitudinali dehiscentibus.

Pistilla in spicam brevem ovoïdeam. Fructus.....

HABITAT ad Bataviam.

(V. S. in Musæo Lessertiano.)

ANONACEÆ.

ANONA SENEGALENSIS. Tab. LXXXVI.

A. SENEGALENSIS. PERS. *Ench.* 2. *p.* 95.

A. foliis latis ovatis subcordatis coriaceis glabris subtùs glaucis, petiolis subvelutinis, pedunculis geminis ternisve, intrà foliaceis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 476.

HABITAT in Senegaliâ, in Guineâ.

EXPLIC. ICON. LXXXVI. — 1. Flos integer. — 2. Petalum. — 3. Stamen. — 4. Pistilla.

ANONA UNIFLORA. Tab. LXXXVII.

A. UNIFLORA. DUNAL. *Monog. p.* 76.

A. foliis oblongis acuminatis glabris subtùs glaucis, pedunculis oppositifoliis, tomentosis candicantibus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 476.

HABITAT in Parâ Brasiliæ.

EXPLIC. ICON. LXXXVII. — 1. Stamen.

UNONA LEPTOPETALA. Tab. LXXXVIII.

U. foliis ovali-oblongis acuminatis ramisque glabris, pedunculis axillaribus ramosis, petalis oblongo-linearibus acuminatis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 496.

HABITAT in insulâ Timor.

EXPLIC. ICON. LXXXVIII. — 1. Stamen anticè visum. — 2. Id. à latere. — 3. Pistilla.

UNONA LUCIDA. Tab. LXXXIX.

U. foliis ovali-oblongis utrinque acuminatis glaberrimis supernè nitidis, pedunculis simplicibus; baccis oblongis obtusis subcompressis subtorulosis breviter stipitatis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 498.

HABITAT in Peruviâ.

EXPLIC. ICON. LXXXIX.—1. Capsulæ.—2. Una longitudinaliter secta.

GUATTERIA ERIOPODA. Tab. XC.

G. foliis oblongo-lanceolatis basi subattenuatis acuminatis junioribus villosis, pedunculis lateralibus solitariis unifloris, tomentoso-hispidis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 505.

HABITAT in Peruviâ circà *Cochero.*

EXPLIC. ICON. XC.—1. Ramus florifer magnitudine naturali.

MENISPERMEÆ.

LARDIZABALA TRITERNATA. Tab. XCI.

L. TRITERNATA. RUIZ. ET PAV. *Syst.* 287.

L. foliis bi seu triternatis, foliolis ovalibus obovatisve obtusis integerrimis, bracteis 2 magnis ovatis ad basim pediculorum. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 512.

HABITAT in Conceptionis Chili sylvis.

EXPLIC. ICON. XCI.—1. Floris masculi stamina monadelpha.—2. Calycis sepalum exterius.—3. Id. interius.—4. Flos fœmineus.—5. Sepalum.—6. Petalum exterius.—7. Id. interius.—8. Pistilla cum staminibus abortivis.—9. Capsulæ.—10. Capsula longitudinaliter secta.

LARDIZABALA TRIFOLIOLATA. Tab. XCII.

L. foliis ternatis trifoliolatis, foliolis ovatis, bracteis secùs pediculos minimis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 513.

HABITAT in Peruviâ.

EXPLIC. ICON. XCII.—1. Flos masculus.—2. Flos fœmineus.—3. Capsulæ.

COCCULUS COTONEASTER. Tab. XCIII.

C. foliis ovalibus integerrimis mucronatis subtùs tomentosis, ramis tomentosis, pedunculis racemosis petiolo longioribus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 525.

Habitat verosimiliter in Americâ calidiori.

Explic. icon. XCIII. — 1. Ramus florifer naturali magnitudine.

COCCULUS OVALIFOLIUS. Tab. XCIV.

C. foliis ovalibus integris mucronatis trinerviis glabris, ramulis villosis, pedunculis inferioribus axillaribus petiolo vix longioribus, summis in racemum terminalem dispositis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 526.

Menispermum ovalifolium. Vahl. *Ined.* in *Herb.* Juss. Pers. *Syn. pl.* 2. *p.* 628.

Habitat in Javâ, in Chinâ.

Explic. icon. XCIV. — 1. Ramus florifer naturali magnitudine.

COCCULUS ACUMINATUS. Tab. XCV.

C. foliis ovato-acuminatis integerrimis glabris basi sub quinquenerviis, cæterùm penninerviis, racemis axillaribus subvillosis petiolo paulò longioribus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 527.

Menispermum acuminatum. Lamk. *Dict.* 4. *p.* 101.

Habitat in Indiâ orientali.

Explic. icon. XCV. — 1. Flos masculus. — 2. Flos hermaphroditus. — 3. Stamen anticè visum. — 4. Id. posticè. — 5. Drupa.

COCCULUS DOMINGENSIS. Tab. XCVI.

C. foliis ovalibus acuminatis integerrimis vix basi subtrinerviis glabris, pedunculis racemoso-paniculatis axillaribus gracilibus folio subbrevioribus è basi tuberculatâ villosâ ortis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 518.

Habitat in Sancto-Domingo.

Explic. icon. XCVI. — 1. Ramus florifer naturali magnitudine.

COCCULUS LAURIFOLIUS. Tab. XCVII.

C. foliis oblongis utrinque acuminatissimis glabris nitidis, pedunculis axillaribus apice ramosis petiolo subbrevioribus. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 530.

Menispermum Laurifolium. Roxb. *Ined. in Herb.* Lamb.

Habitat in Indiâ orientali.

Explic. icon. XCVII. — 1. Ramus florifer.

CISSAMPELOS TROPŒOLIFOLIA. Tab. CXVIII.

C. foliis peltatis ovato-orbiculatis subacutis pilis sparsis utrinque pubescentibus, racemis axillaribus geminis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 532.

Habitat in Americâ meridionali, propè *Cochero.*

Explic. icon. XCVIII. — 1. Ramulus masculus. — 2. Flos masculus. — 3. Flos fœmineus. — 4. Drupa. — 5. Eadem transversim secta. — 6. Eadem longitudinaliter.

CISSAMPELOS ANDROMORPHA. Tab. XCIX.

C. foliis subcordiformibus glaberrimis membranaceis integris mucronatis, pedunculis fœmineis aggregatis ramosis ebracteatis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 539.

Habitat in Cayennâ.

Explic. icon. XCIX. — 1. Pistillum. — 2. Drupa. — 3. Eadem transversim secta.

MENISPERMUM DAURICUM. Tab. C.

M. foliis peltatis glabris cordatis angulatis, angulis acutis, terminali acuminato vix mucronato, racemis masculis geminis capitellatis. *D. C. Syst. nat. veg.* 1. *p.* 540.

M. n°. 86. Gmel : *Sibir.* 3. *p.* 108.

M. Canadense var. *β.* Lamk. *Dict.* 4. *p.* 95.


Habitat in Daouriæ collibus saxoris, ad flumen Chilca, non procul ab urbe Nertchinsk et circà Ouroulga.

Explic. icon. C. — 1. Flos masculus. — 2. Stamen.

In specimine fœmineo, quod à Cl. Fischer recepit professor de Candolle, pedunculi sunt in axillis solitarii, petiolo triplò breviores; pedicelli fructùum vix 4 lin. longi : Carpella baccata sæpius 2 ad apicem thecaphori proprii.

FINIS.

Ex Typis HUZARD-COURCIER, viâ dicta du Jardinet, n° 12.



Node-Veran del.t Poiret sculp.t

CLEMATIS Brasiliana (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 143.)



Turpin del.t et direx.t *Louvet sculp.*

CLEMATIS Mauritiana. *(Lam.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1 pag. 152.)



Node-Véran del.^t *Poiret sculp.*

CLEMATIS lineariloba. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 155.)



Node-Véran del. *Poiret sculp.*

CLEMATIS diversifolia. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 155.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *Plée sculp.t*

CLEMATIS gentianoïdes. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 159.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *F. Plée fils sculp.t*

THALICTRUM clavatum. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 171.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *P. Plée fils sculp.t*

THALICTRUM longistylum. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 171.)



Herb. de Turp. *Plée sculp.*

THALICTRUM dioicum. *(Lin.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 173.)



Node-Veran del.t Louvet sculp.

THALICTRUM petaloïdeum. (*Lin.*)


(*DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 175.*)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

THALICTRUM acutilobum. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 177.)



Node Veran del. *Laurent sculp.*

THALICTRUM galioïdes. *(Nestl.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 180.)



Turpin del. et direx. *Mme Rebel sculp.*

THALICTRUM Thunbergii. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 183.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.*

ANEMONE pusilla. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 197.)



Carmichel sculp.

Turpin del.t et direx.t

ANEMONE cærulea. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 205.)



Carmeukel sculp.

Turpin del.t et direx.t

ANEMONE reflexa. (*Steph.*)

(*DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 207.*)




Lemot sculp.

Node-Veran del.

ANEMONE multifida. *(Poir.) var. α.*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 209.)




Turpin del. et direx.

Dien sculp.

ANEMONE multifida. *(Poir.) var. γ.*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 209.)



Turpin delᵗ et direxᵗ *Herb. Mus. Par.* *Plée sculpᵗ*

ANEMONE umbellata. *(Willd.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 215.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Juss.* *Mme Massard sculp.t*

KNOWLTONIA gracilis. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1 pag. 219.)



Turpin del^t et direx^t *Lemaire sculp^t*

ADONIS Volgensis. *(Tisch.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 543.)



Turpin del.t et direx.t

ADONIS Pyrenaica. (DC.)


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 226.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Desf.* *Dien sculp.*

HAMADRYAS Magellanica. *(Lam.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 226.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.*

CERATOCEPHALUS orthoceras. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 231.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *M.e Massard sculp.t*

RANUNCULUS biternatus. *(Smith.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1 pag. 256.)



Turpin del.t et direx.t *M.lle Coron sculp.*

RANUNCULUS ternatus. *(Thunb.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 242.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Juss.* *M.lle Caron sculp.t*

RANUNCULUS apiifolius. *(Pers.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 262.)



Node-Véran del. *Poiret sculp.*

A. RANUNCULUS angustifolius. *(DC.)* B. RANUNCULUS Pyrenæus. *(Gou.)*

C. RANUNCULUS amplexicaulis. *(Lin.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 263, 264.)




Turpin del.t et direx.t

M.e Massard sculp.

RANUNCULUS pusillus. (Poir.)


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 249.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

RANUNCULUS Bonariensis. *(Poir.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 250.)



Turpin del.t et direx.t *M.e Rebel sculp.t*

RANUNCULUS lateriflorus. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1 pag. 251)



Turpin del.t et direx.t Herb. Mus. Par. Oliv. Plée sculp.t

RANUNCULUS myriophyllus. (DC.)


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 257.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *Plée sculp.t*

RANUNCULUS Orientalis. *(Lin.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 257.)



Turpin del.t et direx.t *Lemet sculp.*

RANUNCULUS leptaleus. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1 pag. 238.)



Herb. Juss.

Mr Massard sculp.^t

Turpin del.^t et direx.^t

RANUNCULUS Guzmanni. *(Humb.)*


(D.C. Regn. veg. vol. 1. pag. 263.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *Dien sculp.t*

RANUNCULUS Krapfia. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 228.)



Node-Véran del. *Poiret sculp.*

RANUNCULUS cortusæfolius. *(Willd.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 264.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Juss.* *Plée sculp.t*

RANUNCULUS Peruvianus. *(Pers.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 274.)



Turpin del et direx. *Plée sculp.*

RANUNCULUS polyrhizos. *(Willd.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 274.)



Turpin del.t et direx.t *Lemoet sculp.*

RANUNCULUS sericeus. *(Poir.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 284.)




Herb. Duss. *Pée sculp.*

Turpin, del.t et direx.t

RANUNCULUS rhœadifolius. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 284.)



Turpin del.t et direx.t *Louvet sculp.*

RANUNCULUS recurvatus. *(Poir.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 290.)



Turpin. del.t et direx.t *P. Lée sculp.t*

RANUNCULUS pedunculåris. *(Smith.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 294.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Juss.* *Rebel sculp.t*

CALTHA appendiculata. *(Pers.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 307/8)



Node-Véran del^t *Poiret sculp.*

TROLLIUS patulus. *(Sal.) var. α.*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 313.)



Turpin del.^t et direx.^t *Me Rebel sculp.^t*

NIGELLA ciliaris. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 327.)




Turpin del.t et direx.t

Poiret sculp.t

NIGELLA divaricata. *(Beaup.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 329.)



Turpin del.t et direx.t

AQUILEGIA Sibirica. *(Lam.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 336.)



Turpin del.t et direx.t *P. Plée fils sculp.t*

AQUILEGIA Alpina. (*Lin.*)


(*DC. Regn. veg. vol. 1 pag. 337.*)



Turpin del.t et direx.t Lossant sculp.t

AQUILEGIA Daourica. (Patr.)


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 338.)



Turpin del.t et direx.t

DELPHINIUM axilliflorum. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 341.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par. Oliv.* *Hebel sculp.*

DELPHINIUM Oliverianum. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 341.)



Turpin del.t et direx.t *M. Rebel sculp.*

DELPHINIUM rigidum. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 344.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Desf.* *M.e Massard sculp.*

DELPHINIUM exsertum. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 345.)



Turpin del.t et direx.t Herb. Mus. Par. Oliv. M.e Massard sculp.

DELPHINIUM flavum. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 346.)



Turpin del.t et direx.t *M.e Rebel sculp.t*

DELPHINIUM virgatum. *(Poir.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 349.)



Node-Veran del. *Lemot sculp.*

DELPHINIUM macropetalum. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 350.)



Nede-Veran del. *Lawet sculp.*

DELPHINIUM obcordatum. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 350.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *M.lle Cornu sculp.*

DELPHINIUM albiflorum. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 353.)



Turpin del. et direx. *Herb. Mus. Par. Turp.* *Mlle Cornu sculp.*

DELPHINIUM tricorne. *(Michx.)*

(DC Regn. veg. vol. 1. pag. 356.)



Turpin del.t et direx. Herb. Mus. Par. Louvet sculp.

DELPHINIUM azureum. *(Michx.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 356.)



Node-Veran del.t *Louvet sculp.*

DELPHINIUM cuneatum. *(Stev.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 359.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

DELPHINIUM speciosum. *(Bieb.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 361.)



Node-Véran del. *Poiret sculp.*

DELPHINIUM Requienii. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 362.)



Turpin del.t et direx.t

Plée sculp.

ACONITUM barbatum. (Pers.)

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 367.)




Turpin del.t et direx.t

Dien sculp.

ACONITUM ciliare. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 1, pag. 378.)



...rpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *Louvet sculp.t*

ACTÆA podocarpa. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 382.)



Herb. Juss.

Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

TETRACERA oblongata. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 399.)



Turpin del. et direx. *Lenoir sculp.*

TETRACERA ovalifolia. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 400.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *Plée sculp.t*

TETRACERA multiflora. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 400.)



Turpin del.t et direx.t *F. Plée fils sculp.t*

TETRACERA Euryandra. *(Vahl.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 402.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. de Juss.* *Plée sculp.*

DAVILLA Brasiliana. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 405.)



Turpin delᵗ et direxᵗ *Dien sculp.*

DELIMA hebecarpa. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 407.)



Turpin del.t et direx.t *Rebel sculp.*

PACHYNEMA complanatum. *(Br.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 412.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. de Juss.* *Poiret sculp.t*

HEMISTEMMA Commersonii. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 413.)



Turpin del.t et direx.t Herb. de Juss. Poiret sculp.t

HEMISTEMMA Aubertii. *(DC.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 413.)



Turpin del.t et direx.t *M.lle Coignet sc.t*

HEMISTEMMA dealbatum. *(R. Brown.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 415.)



Turpin. del.^t et direx.^t *Rebel sculp.*

HEMISTEMMA angustifolium. *(R. Brown.)*


(D.C. Regn. veg. vol. 1. pag. 414.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *F. Plée fils sculp.t*

PLEURANDRA bracteata. *(R. Brown.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 425.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *F. Plée fils sculp.t*

PLEURANDRA sericea. *(R. Brown.)*


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 416.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *F. Plée fils sculp.t*

PLEURANDRA furfuracea. *(R. Brown.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 417.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *F. Plée fils sculp.t*

PLEURANDRA hypericoides. *(DC.)*

(DC. Regn.e veg.t vol. 1. pag. 423.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. de Juss.* *J. Plée fils sculp.t*

WORMIA Madagascariensis. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 433.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Juss.* *Plée père sculp.t*

DRIMYS Chilensis. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 444.)

Magnoliaceæ.



Turpin del.t et direx.t *Plee sculp.*

TASMANNIA aromatica. *(R. Brown.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1, pag. 445 et 547.)



Turpin del.t et direx.t

Plée sculp.t

MICHELIA parviflora. *(Rumph.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 449.)



Herb. Juss.

Turpin del. et direx.

ANONA Senegalensis. *(Pers.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 476.)



Turpin del^t et direx^t Herb. Mus. Par. Lejeune sculp^t

ANONA uniflora. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 476)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Mus. Par.* *F. Plée fils sculp.*

UNONA leptopetala. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 496.)



Turpin del.t et direx.t Herb. Juss. M.me Cornu sculp.t

UNONA lucida. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 1 pag. 498.)



Turpin del.t et direx.t

F. Plée filo sculp.t

GUATTERIA eriopoda. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 508.)



Turpin del.t et direx.t F. Plée filz sculp.t

LARDIZABALA triternata. (Fl. P.)

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 512.)




Turpin del. et direx.

F. Plée fils sculp.

LARDIZABALA trifoliata. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 313.)



Plée sculp.

Turpin del. et direx.

COCCULUS cotoneaster. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 525.)




Turpin del.t et direx.t

Poiret sculp.

COCCULUS ovalifolius. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 526.)



COCCULUS acuminatus. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 527.)



Turpin del.t et direx.t *Herb. Turp.* *Plée sculp.t*

COCCULUS Domingensis. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 528.)




Turpin del.t et direx.t

M.e Rebel sculp.t

COCCULUS laurifolius. (DC.)


(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 530.)



Turpin del. direx. Herb. Mus. Par. Poiret sculp.

CISSAMPELOS tropæolifolia. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 532.)



CISSAMPELOS andromorpha. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 1 pag. 539.)



Turpin del. et direx. Poiret sculp.

MENISPERMUM Dauricum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 1. pag. 540.)